

Monitoreringsrapport

2. kvartal 2021

Denne rapport følger op på efterlevelsen af RADS/Medicinrådets lægemiddelrekommandationer indenfor fagudvalgene: G-CSF, Multipel sklerose, Svær Astma Væksthormon, Hepatitis C samt Metastatisk Kastrationsresistent Prostatacancer. Efterlevelsen vises regionsvis. Opfølgingsmodellerne er baseret på input fra fagudvalgene.

Rapporten viser de overordnede resultater af 2. kvartals rapportering med data for seneste kvartal samt de to seneste kvartaler. Rapporten er baseret på data om sygehusapotekernes salg ud til afdelingerne.

Datagrundlaget for monitoreringen (inkl. modelbeskrivelser for de enkelte fagudvalg samt forbruget fordelt på afdelinger) er udsendt til analyseenhederne i de enkelte regioner.

Læsevejledning

Et pejlemærke - den gule zone defineres som et forventet fremtidigt forbrug af et eller flere lægemidler i en eller flere patientgrupper som følge af en ny behandlingsvejledning.


Grøn eller gul zone markerer forbrug, der er som forventet.

Rød Zone markerer forbrug, der ligger uden for det forventede. Her kan være behov for en opfølgning eller et særlig fokus omkring udviklingen.


Blå søjler angiver regionens forbrug af det/de udvalgte lægemidler i det pågældende kvartal

Zonerne starter, når lægemiddelrekommandationen træder i kraft.

Her forventes forbruget at være over et bestemt minimumsniveau



Her forventes forbruget at være under et bestemt maksimumsniveau



G-CSF		Forbrug Ziextenzo (pegfilgrastim)(Før april 20 Pelgraz (pegfilgrastim))		Forbrug Accofil (filgrastim)		Kommentarer	
<p>4. Kvartal 2020, 1. Kvartal 2021, 2. Kvartal 2021</p>		<p>4. Kvartal 2020, 1. Kvartal 2021, 2. Kvartal 2021</p>				<p>Dato for seneste lægemiddelrekommandations ikrafttrædelse: 1. april 2020. Det rekommanderede lægemiddel indenfor indholdsstoffet filgrastim er fortsat Accofil. Det rekommanderede lægemiddel indenfor indholdsstofferne lipegfilgrastim/pegfilgrastim skiftede fra denne dato fra Pelgraz (pegfilgrastim) til Ziextenzo (pegfilgrastim).</p> <p>Intervaller for pejlemærkerne forventes at kunne nås efter op til 3 måneders indkøringsperiode af den nye rekommandation.</p> <p>Forbruget af Accofil vises ud af det totale forbrug af filgrastim. Forbruget af Ziextenzo (pegfilgrastim) vises ud af det samlede forbrug af lipegfilgrastim/pegfilgrastim.</p> <p>Regionens G-CSF forbrug det seneste år: ca.2,7 mio. kr.</p>	
Multipel Sklerose		Forbrug Aubagio® (teriflunomid)		Forbrug Tecfidera® (dimethylfumarat)		Kommentarer	
<p>4. Kvartal 2020, 1. Kvartal 2021, 2. Kvartal 2021</p>		<p>4. Kvartal 2020, 1. Kvartal 2021, 2. Kvartal 2021</p>				<p>Dato for seneste lægemiddelrekommandations ikrafttrædelse: 1. december 2019. Her skiftede det rekommanderede 1. valg fra Aubagio til Tecfidera.</p> <p>Det gælder for patienter med gennemsnitlig sygdomsaktivitet, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 95 % af nye patienter, der ikke ønsker graviditet skal behandles med Tecfidera, som er 1. valgs lægemiddel. 2. valgs lægemiddel er Aubagio, som derfor ikke bør bruges til mere end 5 % af disse patienter. - 80-95 % af nye patienter, der ønsker graviditet inden for et år skal bruge Tecfidera som 1. valg. 2. valgs lægemiddel er Aubagio, som derfor ikke bør bruges til mere end 5-20 % af disse patienter. <p>Det forventes, at det relative forbrug af Tecfidera vil stige, imens det relative forbrug af Aubagio vil falde fra 1. december 2019. Forbruget af hhv. Tecfidera og Aubagio er angivet som en andel af det samlede forbrug af Tecfidera og Aubagio.</p> <p>Regionens Multipel Sklerose forbrug det seneste år:76,9 mio. kr.</p>	
Væksthormon		Forbrug Omnitrope (Surepal) - voksne		Forbrug Omnitrope (Surepal) - børn		Kommentarer	
<p>4. Kvartal 2020, 1. Kvartal 2021, 2. Kvartal 2021</p>		<p>4. Kvartal 2020, 1. Kvartal 2021, 2. Kvartal 2021</p>				<p>Dato for seneste lægemiddelrekommandations ikrafttrædelse: 1. september 2017.</p> <p>Intervaller for pejlemærkerne forventes at kunne nås straks, da det rekommanderede 1. valgspræparat er det samme som i tidligere kontraktperiode.</p> <p>Forbruget af Omnitrope (Surepal) vises i % af det samlede forbrug af væksthormon (somatropin) på henholdsvis udvalgte børneafdelinger og udvalgte voksenafdelinger i regionen.</p> <p>Regionens forbrug af væksthormon det seneste år: ca. 2,3 mio. kr.</p>	
Hepatitis C		Forbrug Epclusa, Maviret, Zepatier				Kommentarer	
<p>4. Kvartal 2020, 1. Kvartal 2021, 2. Kvartal 2021</p>						<p>Dato for lægemiddelrekommandationens ikrafttrædelse: november 2018</p> <p>Zepatier er 1. valg til GT (GenoType) 1a og 1b patienter med og uden cirrose samt til GT4 patienter med og uden cirrose.</p> <p>Epclusa er 1. valg til GT2 og GT3 patienter med cirrose.</p> <p>Maviret er 1. valg til GT2 og GT3 patienter uden cirrose.</p> <p>Forbruget af de tre 1. valgs lægemidler holdes op mod det samlede forbrug af lægemidler på terapiområdet.</p> <p>Regionens Hepatitis C forbrug det seneste år: ca. 3,6 mio. kr.</p>	

Metastatisk kastrationsresistent prostatacancer						Kommentarer	
<p>Forbrug Zytiga® (abirateron)</p> <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>	<p>Forbrug Xtandi® (enzalutamid)</p> <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>					<p>Dato for seneste lægemiddelrekommandations ikrafttrædelse: 1. januar 2020</p> <p>Forbruget af hhv. Zytiga og Xtandi er angivet som en andel af det samlede forbrug af Zytiga og Xtandi.</p> <p>Regionens forbrug på området det seneste år: ca. 51,9 mio. kr.</p>	
Svær astma						Kommentarer	
<p>Svær eosinofil astma - forbrug Nucala</p> <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>	<p>Svær allergisk astma - forbrug Dupixent</p> <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>					<p>Dato for lægemiddelrekommandationens ikrafttrædelse: 1. februar 2021</p> <p>Intervaller for pejlemærkerne forventes først at kunne nås i 1. kvartal 2022. Det skyldes, at rekommandationen kun gælder nye patienter og eksisterende patienter derfor fortsat kan behandles med det oprindelige behandlingsvalg.</p> <p>Forbruget af Nucala (mepolizumab) vises i % af det samlede forbrug af Cinqero (reslizumab), Fasentra (benralizumab) og Nucala (mepolizumab).</p> <p>Forbruget af Dupixent (dupilumab) vises i % af det samlede forbrug af Xolair (omalizumab) og Dupixent (dupilumab).</p> <p>Regionens forbrug af midler til behandling af svær astma det seneste år: ca. 14,7 mio. kr.</p>	

G-CSF		Forbrug Accofil (filgrastim)		Kommentarer	
<p>Forbrug Ziextenzo (pegfilgrastim)(Før april 20 Pelgraz (pegfilgrastim))</p> <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>	<p>Forbrug Accofil (filgrastim)</p> <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>			<p>Kommentarer</p> <p>Dato for seneste lægemiddelrekommandations ikrafttrædelse: 1. april 2020. Det rekommanderede lægemiddel indenfor indholdsstoffet filgrastim er fortsat Accofil. Det rekommanderede lægemiddel indenfor indholdsstofferne lipegfilgrastim/pegfilgrastim skiftede fra denne dato fra Pelgraz (pegfilgrastim) til Ziextenzo (pegfilgrastim).</p> <p>Intervaller for pejlemærkerne forventes at kunne nås efter op til 3 måneders indkøbsperiode af den nye rekommandation.</p> <p>Forbruget af Accofil vises ud af det totale forbrug af filgrastim. Forbruget af Ziextenzo (pegfilgrastim) vises ud af det samlede forbrug af lipegfilgrastim/pegfilgrastim.</p> <p>Regionens G-CSF forbrug det seneste år: ca. 4,3 mio. kr.</p>	
Multipel Sklerose		Forbrug Tecfidera® (dimethylfumarat)		Kommentarer	
<p>Forbrug Aubagio® (teriflunomid)</p> <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>	<p>Forbrug Tecfidera® (dimethylfumarat)</p> <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>			<p>Kommentarer</p> <p>Dato for seneste lægemiddelrekommandations ikrafttrædelse: 1. december 2019. Her skiftede det rekommanderede 1. valg fra Aubagio til Tecfidera.</p> <p>Det gælder for patienter med gennemsnitlig sygdomsaktivitet, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 95 % af nye patienter, der ikke ønsker graviditet skal behandles med Tecfidera, som er 1. valgs lægemiddel. 2. valgs lægemiddel er Aubagio, som derfor ikke bør bruges til mere end 5 % af disse patienter. - 80-95 % af nye patienter, der ønsker graviditet inden for et år skal bruge Tecfidera som 1. valg. 2. valgs lægemiddel er Aubagio, som derfor ikke bør bruges til mere end 5-20 % af disse patienter. <p>Det forventes, at det relative forbrug af Tecfidera vil stige, imens det relative forbrug af Aubagio vil falde fra 1. december 2019. Forbruget af hhv. Tecfidera og Aubagio er angivet som en andel af det samlede forbrug af Tecfidera og Aubagio.</p> <p>Regionens Multipel Sklerose forbrug det seneste år: 182,9 mio. kr.</p>	
Væksthormon		Forbrug Omnitrope (Surepal) - voksne		Kommentarer	
<p>Forbrug Omnitrope (Surepal) - voksne</p> <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>	<p>Forbrug Omnitrope (Surepal) - børn</p> <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>			<p>Kommentarer</p> <p>Dato for seneste lægemiddelrekommandations ikrafttrædelse: 1. september 2017.</p> <p>Intervaller for pejlemærkerne forventes at kunne nås straks, da det rekommanderede 1. valgspræparat er det samme som i tidligere kontraktperiode.</p> <p>Forbruget af Omnitrope (Surepal) vises i % af det samlede forbrug af væksthormon (somatropin) på henholdsvis udvalgte børneafdelinger og udvalgte voksenafdelinger i regionen.</p> <p>Regionens forbrug af væksthormon det seneste år: ca. 4,6 mio. kr.</p>	
Hepatitis C		Forbrug Epclusa, Maviret, Zepatier		Kommentarer	
<p>Forbrug Epclusa, Maviret, Zepatier</p> <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>			<p>Kommentarer</p> <p>Dato for lægemiddelrekommandationens ikrafttrædelse: november 2018</p> <p>Zepatier er 1. valg til GT (GenoType) 1a og 1b patienter med og uden cirrose samt til GT4 patienter med og uden cirrose.</p> <p>Epclusa er 1. valg til GT2 og GT3 patienter med cirrose.</p> <p>Maviret er 1. valg til GT2 og GT3 patienter uden cirrose.</p> <p>Forbruget af de tre 1. valgs lægemidler holdes op mod det samlede forbrug af lægemidler på terapiområdet.</p> <p>Regionens Hepatitis C forbrug det seneste år: ca. 4 mio. kr.</p>		

Metastatisk kastrationsresistent prostatacancer						Kommentarer	
<p>Forbrug Zytiga® (abirateron)</p> <p>4. Kvartal 2020, 1. Kvartal 2021, 2. Kvartal 2021</p>	<p>Forbrug Xtandi® (enzalutamid)</p> <p>4. Kvartal 2020, 1. Kvartal 2021, 2. Kvartal 2021</p>					<p>Dato for seneste lægemiddelrekommandations ikrafttrædelse: 1. januar 2020</p> <p>Forbruget af hhv. Zytiga og Xtandi er angivet som en andel af det samlede forbrug af Zytiga og Xtandi.</p> <p>Regionens forbrug på området det seneste år: ca. 82,6 mio. kr. Bemærk, at en del af regionens forbrug ikke indgår i pejlemærket. Det skyldes, at forbruget registreres på apotekets egne varenumre. Det drejer sig om følgende forbrug det seneste år:</p> <p>8,5 mio.kr. for Xtandi (Enzalutamid) 1,8 mio.kr. for Zytiga (Abirateron)</p>	
Svær astma						Kommentarer	
<p>Svær eosinofil astma - forbrug Nucala</p> <p>4. Kvartal 2020, 1. Kvartal 2021, 2. Kvartal 2021</p>	<p>Svær allergisk astma - forbrug Dupixent</p> <p>4. Kvartal 2020, 1. Kvartal 2021, 2. Kvartal 2021</p>					<p>Dato for lægemiddelrekommandationens ikrafttrædelse: 1. februar 2021</p> <p>Intervaller for pejlemærkerne forventes først at kunne nås i 1. kvartal 2022. Det skyldes, at rekommandationen kun gælder nye patienter og eksisterende patienter derfor fortsat kan behandles med det oprindelige behandlingsvalg.</p> <p>Forbruget af Nucala (mepolizumab) vises i % af det samlede forbrug af Cinqero (reslizumab), Fasentra (benralizumab) og Nucala (mepolizumab).</p> <p>Forbruget af Dupixent (dupilumab) vises i % af det samlede forbrug af Xolair (omalizumab) og Dupixent (dupilumab).</p> <p>Regionens forbrug af midler til behandling af svær astma det seneste år: ca. 37,8 mio. kr.</p>	

G-CSF		Forbrug Accofil (filgrastim)		Kommentarer	
<p>Forbrug Ziextenzo (pegfilgrastim)(Før april 20 Pelgraz (pegfilgrastim))</p> <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>	<p>Forbrug Accofil (filgrastim)</p> <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>	<p>Dato for seneste lægemiddelrekommandations ikrafttrædelse: 1. april 2020. Det rekommanderede lægemiddel indenfor indholdsstoffet filgrastim er fortsat Accofil. Det rekommanderede lægemiddel indenfor indholdsstofferne lipegfilgrastim/pegfilgrastim skiftede fra denne dato fra Pelgraz (pegfilgrastim) til Ziextenzo (pegfilgrastim).</p> <p>Intervaller for pejlemærkerne forventes at kunne nås efter op til 3 måneders indkøbsperiode af den nye rekommandation.</p> <p>Forbruget af Accofil vises ud af det totale forbrug af filgrastim. Forbruget af Ziextenzo (pegfilgrastim) vises ud af det samlede forbrug af lipegfilgrastim/pegfilgrastim.</p> <p>Regionens G-CSF forbrug det seneste år: ca. 1,2 mio. kr.</p>			
Multipel Sklerose		Forbrug Tecfidera® (dimethylfumarat)		Kommentarer	
<p>Forbrug Aubagio® (teriflunomid)</p> <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>	<p>Forbrug Tecfidera® (dimethylfumarat)</p> <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>	<p>Dato for seneste lægemiddelrekommandations ikrafttrædelse: 1. december 2019. Her skiftede det rekommanderede 1. valg fra Aubagio til Tecfidera.</p> <p>Det gælder for patienter med gennemsnitlig sygdomsaktivitet, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 95 % af nye patienter, der ikke ønsker graviditet skal behandles med Tecfidera, som er 1. valgs lægemiddel. 2. valgs lægemiddel er Aubagio, som derfor ikke bør bruges til mere end 5 % af disse patienter. - 80-95 % af nye patienter, der ønsker graviditet inden for et år skal bruge Tecfidera som 1. valg. 2. valgs lægemiddel er Aubagio, som derfor ikke bør bruges til mere end 5-20 % af disse patienter. <p>Det forventes, at det relative forbrug af Tecfidera vil stige, imens det relative forbrug af Aubagio vil falde fra 1. december 2019. Forbruget af hhv. Tecfidera og Aubagio er angivet som en andel af det samlede forbrug af Tecfidera og Aubagio.</p> <p>Regionens Multipel Sklerose forbrug det seneste år: 77,2 mio. kr.</p>			
Væksthormon		Forbrug Omnitrope (Surepal) - børn		Kommentarer	
<p>Forbrug Omnitrope (Surepal) - voksne</p> <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>	<p>Forbrug Omnitrope (Surepal) - børn</p> <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>	<p>Dato for seneste lægemiddelrekommandations ikrafttrædelse: 1. september 2017.</p> <p>Intervaller for pejlemærkerne forventes at kunne nås straks, da det rekommanderede 1. valgspræparat er det samme som i tidligere kontraktperiode.</p> <p>Forbruget af Omnitrope (Surepal) vises i % af det samlede forbrug af væksthormon (somatropin) på henholdsvis udvalgte børneafdelinger og udvalgte voksenafdelinger i regionen.</p> <p>Regionens forbrug af væksthormon det seneste år: ca. 2,5 mio. kr.</p>			
Hepatitis C		Forbrug Epclusa, Maviret, Zepatier		Kommentarer	
<p>Forbrug Epclusa, Maviret, Zepatier</p> <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>	<p>Dato for lægemiddelrekommandationens ikrafttrædelse: november 2018</p> <p>Zepatier er 1. valg til GT (GenoType) 1a og 1b patienter med og uden cirrose samt til GT4 patienter med og uden cirrose.</p> <p>Epclusa er 1. valg til GT2 og GT3 patienter med cirrose.</p> <p>Maviret er 1. valg til GT2 og GT3 patienter uden cirrose.</p> <p>Forbruget af de tre 1. valgs lægemidler holdes op mod det samlede forbrug af lægemidler på terapiområdet.</p> <p>Regionens Hepatitis C forbrug det seneste år: ca. 2,8 mio. kr.</p>				

Metastatisk kastrationsresistent prostatacancer						Kommentarer	
<p>Forbrug Zytiga® (abirateron)</p> <p>4. Kvartal 2020, 1. Kvartal 2021, 2. Kvartal 2021</p>	<p>Forbrug Xtandi® (enzalutamid)</p> <p>4. Kvartal 2020, 1. Kvartal 2021, 2. Kvartal 2021</p>					<p>Dato for seneste lægemiddelrekommandations ikrafttrædelse: 1. januar 2020</p> <p>Forbruget af hhv. Zytiga og Xtandi er angivet som en andel af det samlede forbrug af Zytiga og Xtandi.</p> <p>Regionens forbrug på området det seneste år: ca. 19 mio. kr.</p>	
Svær astma						Kommentarer	
<p>Svær eosinofil astma - forbrug Nucala</p> <p>4. Kvartal 2020, 1. Kvartal 2021, 2. Kvartal 2021</p>	<p>Svær allergisk astma - forbrug Dupixent</p> <p>4. Kvartal 2020, 1. Kvartal 2021, 2. Kvartal 2021</p>					<p>Dato for lægemiddelrekommandationens ikrafttrædelse: 1. februar 2021</p> <p>Intervaller for pejlemærkerne forventes først at kunne nås i 1. kvartal 2022. Det skyldes, at rekommandationen kun gælder nye patienter og eksisterende patienter derfor fortsat kan behandles med det oprindelige behandlingsvalg.</p> <p>Forbruget af Nucala (mepolizumab) vises i % af det samlede forbrug af Cinqero (reslizumab), Fasentra (benralizumab) og Nucala (mepolizumab).</p> <p>Forbruget af Dupixent (dupilumab) vises i % af det samlede forbrug af Xolair (omalizumab) og Dupixent (dupilumab).</p> <p>Regionens forbrug af midler til behandling af svær astma det seneste år ca. 17,8 mio. kr.</p>	

G-CSF		Forbrug Accofil (filgrastim)		Kommentarer	
<p>Forbrug Ziextenzo (pegfilgrastim)(Før april 20 Pelgraz (pegfilgrastim))</p> <p>4. Kvartal 2020, 1. Kvartal 2021, 2. Kvartal 2021</p>	<p>Forbrug Accofil (filgrastim)</p> <p>4. Kvartal 2020, 1. Kvartal 2021, 2. Kvartal 2021</p>	<p>Dato for seneste lægemiddelrekommandations ikrafttrædelse: 1. april 2020. Det rekommanderede lægemiddel indenfor indholdsstoffet filgrastim er fortsat Accofil. Det rekommanderede lægemiddel indenfor indholdsstofferne lipegfilgrastim/pegfilgrastim skiftede fra denne dato fra Pelgraz (pegfilgrastim) til Ziextenzo (pegfilgrastim).</p> <p>Intervaller for pejlemærkerne forventes at kunne nås efter op til 3 måneders indkøringsperiode af den nye rekommandation.</p> <p>Forbruget af Accofil vises ud af det totale forbrug af filgrastim. Forbruget af Ziextenzo (pegfilgrastim) vises ud af det samlede forbrug af lipegfilgrastim/pegfilgrastim.</p> <p>Regionens G-CSF forbrug det seneste år: ca. 3,4 mio. kr.</p>			
Multipel Sklerose		Forbrug Tecfidera® (dimethylfumarat)		Kommentarer	
<p>Forbrug Aubagio® (teriflunomid)</p> <p>4. Kvartal 2020, 1. Kvartal 2021, 2. Kvartal 2021</p>	<p>Forbrug Tecfidera® (dimethylfumarat)</p> <p>4. Kvartal 2020, 1. Kvartal 2021, 2. Kvartal 2021</p>	<p>Dato for seneste lægemiddelrekommandations ikrafttrædelse: 1. december 2019. Her skiftede det rekommanderede 1. valg fra Aubagio til Tecfidera.</p> <p>Det gælder for patienter med gennemsnitlig sygdomsaktivitet, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 95 % af nye patienter, der ikke ønsker graviditet skal behandles med Tecfidera, som er 1. valgs lægemiddel. 2. valgs lægemiddel er Aubagio, som derfor ikke bør bruges til mere end 5 % af disse patienter. - 80-95 % af nye patienter, der ønsker graviditet inden for et år skal bruge Tecfidera som 1. valg. 2. valgs lægemiddel er Aubagio, som derfor ikke bør bruges til mere end 5-20 % af disse patienter. <p>Det forventes, at det relative forbrug af Tecfidera vil stige, imens det relative forbrug af Aubagio vil falde fra 1. december 2019. Forbruget af hhv. Tecfidera og Aubagio er angivet som en andel af det samlede forbrug af Tecfidera og Aubagio.</p> <p>Regionens Multipel Sklerose forbrug det seneste år: 178,4 mio. kr.</p>			
Væksthormon		Forbrug Omnitrope (Surepal) - børn		Kommentarer	
<p>Forbrug Omnitrope (Surepal) - voksne</p> <p>4. Kvartal 2020, 1. Kvartal 2021, 2. Kvartal 2021</p>	<p>Forbrug Omnitrope (Surepal) - børn</p> <p>4. Kvartal 2020, 1. Kvartal 2021, 2. Kvartal 2021</p>	<p>Dato for seneste lægemiddelrekommandations ikrafttrædelse: 1. september 2017.</p> <p>Intervaller for pejlemærkerne forventes at kunne nås straks, da det rekommanderede 1. valgspræparat er det samme som i tidligere kontraktperiode.</p> <p>Forbruget af Omnitrope (Surepal) vises i % af det samlede forbrug af væksthormon (somatropin) på henholdsvis udvalgte børneafdelinger og udvalgte voksenafdelinger i regionen.</p> <p>Regionens forbrug af væksthormon det seneste år: ca. 6,5 mio. kr.</p>			
Hepatitis C		Forbrug Epclusa, Maviret, Zepatier		Kommentarer	
<p>Forbrug Epclusa, Maviret, Zepatier</p> <p>4. Kvartal 2020, 1. Kvartal 2021, 2. Kvartal 2021</p>		<p>Dato for lægemiddelrekommandationens ikrafttrædelse: november 2018</p> <p>Zepatier er 1. valg til GT (GenoType) 1a og 1b patienter med og uden cirrose samt til GT4 patienter med og uden cirrose.</p> <p>Epclusa er 1. valg til GT2 og GT3 patienter med cirrose.</p> <p>Maviret er 1. valg til GT2 og GT3 patienter uden cirrose.</p> <p>Forbruget af de tre 1. valgs lægemidler holdes op mod det samlede forbrug af lægemidler på terapiområdet.</p> <p>Regionens Hepatitis C forbrug det seneste år: ca. 5,3 mio. kr.</p>			

Metastatisk kastrationsresistent prostatacancer						Kommentarer	
<p>Forbrug Zytiga® (abirateron)</p> <p>4. Kvartal 2020, 1. Kvartal 2021, 2. Kvartal 2021</p>	<p>Forbrug Xtandi® (enzalutamid)</p> <p>4. Kvartal 2020, 1. Kvartal 2021, 2. Kvartal 2021</p>					<p>Dato for seneste lægemiddelrekommandations ikrafttrædelse: 1. januar 2020</p> <p>Forbruget af hhv. Zytiga og Xtandi er angivet som en andel af det samlede forbrug af Zytiga og Xtandi.</p> <p>Regionens forbrug på området det seneste år: ca. 76,9 mio. kr.</p>	
Svær astma						Kommentarer	
<p>Svær eosinofil astma - forbrug Nucala</p> <p>4. Kvartal 2020, 1. Kvartal 2021, 2. Kvartal 2021</p>	<p>Svær allergisk astma - forbrug Dupixent</p> <p>4. Kvartal 2020, 1. Kvartal 2021, 2. Kvartal 2021</p>					<p>Dato for lægemiddelrekommandationens ikrafttrædelse: 1. februar 2021</p> <p>Intervallerne for pejlemærkerne forventes først at kunne nås i 1. kvartal 2022. Det skyldes, at rekommandationen kun gælder nye patienter og eksisterende patienter derfor fortsat kan behandles med det oprindelige behandlingsvalg.</p> <p>Forbruget af Nucala (mepolizumab) vises i % af det samlede forbrug af Cinqero (reslizumab), Fasentra (benralizumab) og Nucala (mepolizumab).</p> <p>Forbruget af Dupixent (dupilumab) vises i % af det samlede forbrug af Xolair (omalizumab) og Dupixent (dupilumab).</p> <p>Regionens forbrug af midler til behandling af svær astma det seneste år: ca. 60,7 mio. kr.</p>	

G-CSF				Kommentarer	
<p>Forbrug Ziextenzo (pegfilgrastim)(Før april 20 Pelgraz (pegfilgrastim))</p>  <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>	<p>Forbrug Accofil (filgrastim)</p>  <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>			<p>Dato for seneste lægemiddelrekommandations ikrafttrædelse: 1. april 2020. Det rekommanderede lægemiddel indenfor indholdsstoffet filgrastim er fortsat Accofil. Det rekommanderede lægemiddel indenfor indholdsstofferne lipegfilgrastim/pegfilgrastim skiftede fra denne dato fra Pelgraz (pegfilgrastim) til Ziextenzo (pegfilgrastim).</p> <p>Intervaller for pejlemærkerne forventes at kunne nås efter op til 3 måneders indkørringsperiode af den nye rekommandation.</p> <p>Forbruget af Accofil vises ud af det totale forbrug af filgrastim. Forbruget af Ziextenzo (pegfilgrastim) vises ud af det samlede forbrug af lipegfilgrastim/pegfilgrastim.</p> <p>Regionens G-CSF forbrug det seneste år: ca. 7,3 mio. kr.</p>	
Multipel Sklerose				Kommentarer	
<p>Forbrug Aubagio® (teriflunomid)</p>  <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>	<p>Forbrug Tecfidera® (dimethylfumarat)</p>  <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>			<p>Dato for seneste lægemiddelrekommandations ikrafttrædelse: 1. december 2019. Her skiftede det rekommanderede 1. valg fra Aubagio til Tecfidera.</p> <p>Det gælder for patienter med gennemsnitlig sygdomsaktivitet, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 95 % af nye patienter, der ikke ønsker graviditet skal behandles med Tecfidera, som er 1. valgs lægemiddel. 2. valgs lægemiddel er Aubagio, som derfor ikke bør bruges til mere end 5 % af disse patienter. - 80-95 % af nye patienter, der ønsker graviditet inden for et år skal bruge Tecfidera som 1. valg. 2. valgs lægemiddel er Aubagio, som derfor ikke bør bruges til mere end 5-20 % af disse patienter. <p>Det forventes, at det relative forbrug af Tecfidera vil stige, imens det relative forbrug af Aubagio vil falde fra 1. december 2019. Forbruget af hhv. Tecfidera og Aubagio er angivet som en andel af det samlede forbrug af Tecfidera og Aubagio.</p> <p>Regionens Multipel Sklerose forbrug det seneste år: 291,6 mio. kr.</p>	
Væksthormon				Kommentarer	
<p>Forbrug Omnitrope (Surepal) - voksne</p>  <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>	<p>Forbrug Omnitrope (Surepal) - børn</p>  <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>			<p>Dato for seneste lægemiddelrekommandations ikrafttrædelse: 1. september 2017.</p> <p>Intervaller for pejlemærkerne forventes at kunne nås straks, da det rekommanderede 1. valgspræparat er det samme som i tidligere kontraktperiode.</p> <p>Forbruget af Omnitrope (Surepal) vises i % af det samlede forbrug af væksthormon (somatropin) på henholdsvis udvalgte børneafdelinger og udvalgte voksenafdelinger i regionen.</p> <p>Regionens forbrug af væksthormon det seneste år: ca. 15,3 mio. kr.</p>	
Hepatitis C				Kommentarer	
<p>Forbrug Eplclusa, Maviret, Zepatier</p>  <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>				<p>Dato for lægemiddelrekommandationens ikrafttrædelse: november 2018</p> <p>Zepatier er 1. valg til GT (GenoType) 1a og 1b patienter med og uden cirrose samt til GT4 patienter med og uden cirrose.</p> <p>Eplclusa er 1. valg til GT2 og GT3 patienter med cirrose.</p> <p>Maviret er 1. valg til GT2 og GT3 patienter uden cirrose.</p> <p>Forbruget af de tre 1. valgs lægemidler holdes op mod det samlede forbrug af lægemidler på terapiområdet.</p> <p>Regionens Hepatitis C forbrug det seneste år: ca. 10,3 mio. kr.</p>	

Metastatisk kastrationsresistent prostatacancer						Kommentarer	
<p>Forbrug Zytiga® (abirateron)</p> <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>	<p>Forbrug Xtandi® (enzalutamid)</p> <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>					<p>Dato for seneste lægemiddelrekommandations ikrafttrædelse: 1. januar 2020</p> <p>Forbruget af hhv. Zytiga og Xtandi er angivet som en andel af det samlede forbrug af Zytiga og Xtandi.</p> <p>Regionens forbrug på området det seneste år: ca. 88,6 mio. kr.</p>	
Svær astma						Kommentarer	
<p>Svær eosinofil astma - forbrug Nucala</p> <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>	<p>Svær allergisk astma - forbrug Dupixent</p> <p>4. Kvartal 2020 1. Kvartal 2021 2. Kvartal 2021</p>					<p>Dato for lægemiddelrekommandationens ikrafttrædelse: 1. februar 2021</p> <p>Intervaller for pejlemærkerne forventes først at kunne nås i 1. kvartal 2022. Det skyldes, at rekommandationen kun gælder nye patienter og eksisterende patienter derfor fortsat kan behandles med det oprindelige behandlingsvalg.</p> <p>Forbruget af Nucala (mepolizumab) vises i % af det samlede forbrug af Cinquaero (reslizumab), Fasenra (benralizumab) og Nucala (mepolizumab).</p> <p>Forbruget af Dupixent (dupilumab) vises i % af det samlede forbrug af Xolair (omalizumab) og Dupixent (dupilumab).</p> <p>Regionens forbrug af midler til behandling af svær astma det seneste år: ca. 73,8 mio. kr.</p>	